

OVELLA

Poliéstrica estacional (fotoperíode -)
Cicle 17 d (14-19)

Proestre: (~1 d):

Sense simptomatologia

Inspecció: moc transparent

Estre: (24-36 hores)

Ovulació: 24 h de l'inici de l'estre ⇒ 1 Cubrició: 12-24 h

Simptomatologia: molt poc marcada sense la presència del mascle:

↑ ↑ excitabilitat: caminar, girar sobre ella mateixa, 1^a en aixecar-se

Bels (balidos)

Disminueix la producció de llet

Acceptació del mascle

Inspecció: Vulva edematosa, vermella

Moc abundant i tèrbol

Detecció de l'estre

Molt difícil sense el mascle

Mascle marcador: vasectomitzat, desviació de penis, amb dispositius marcadors.

Resistència elèctrica del moc vaginal

Metaestre + Diestre (15 d):

Retorn a la normalitat: no es deixa muntar

Inspecció: Mucosa vaginal pàl·lida i seca

CABRA

Poliéstrica estacional (fotoperiode -)

Cicle 21 d (18-24)

Proestre: (~1 d):

Atrau al mascle però no es deixa muntar

Inspecció: moc transparent

Estre: (18-36 hores)

Ovulacio: 12-36 h de l'inici de l'estre ⇒ 1 Cubrició: 24-36 h

Simptomatologia: molt poc marcada sense la presència del mascle però més marcada que en l'ovella:

↑ ↑ excitabilitat: caminar, girar sobre ella mateixa, 1^a en aixecar-se

Bels (balidos)

Disminueix la producció de llet i gana

Acceptació del mascle

Comportament homosexual

Inspecció: Vulva edematosa, vermella

Moc poc abundant i tèrbol

Detecció de l'estre

Molt difícil sense el mascle

Mascle marcador: vasectomitzat, desviació de penis, amb dispositius marcadors.

Resistència elèctrica del moc vaginal

Metaestre (2-3 d) + **Diestre** (16 d):

Retorn a la normalitat: no es deixa muntar

Inspecció: Mucosa vaginal pàl·lida i seca